


# SYSTEMATISCHER IMPF- UND IMMUNISIERUNGSKALENDER

# 2025

# ANDALUSIEN, SPANIEN

Aktualisierungsdatum: Februar 2025



**dunkle Farbe** Systematische Impfung | **helle Farbe** Nachholimpfung für ungeimpfte Personen

**1. MONOKLONALER ANTIKÖRPER ANTI-RSV (Respiratorisches Synzytialvirus) (Nirsevimab, Beyfortus®):** während der VRS-Saison (Oktober bis März) wird eine Dosis für Neugeborene empfohlen: die zwischen dem 1. April und dem 30. September (vor der VRS-Saison) geboren wurden: Erhalten ab der letzten Septemberwoche Nirsevimab, die zwischen dem 1. Oktober und dem 31. März (während der RSV-Saison) geboren wurden: erhalten Nirsevimab so bald wie möglich nach der Geburt. **2. TETANOS-DIPHTHERIE-TOSPHERIN (Tdpa; Boostrix®):** Eine Dosis pro Schwangerschaft ab der 27. Schwangerschaftswoche, vorzugsweise jedoch in der 27. oder 28. **3. TETANOS-DIPHTHERIE-TOSPHERIN-POLYOMYELITIS (DTPa-VPI; Tetraxim®):** Eine Dosis im Alter von 6 Jahren (geboren im Jahr 2019). Impfnachholung für diejenigen, die am oder nach dem 1. Januar 2017 geboren wurden und ein 2+1-Schema (2, 4 und 11 Monate) erhalten haben. Diejenigen, die vor 2017 geboren wurden (erhielten ein 3+1-Schema: 2, 4, 6 und 18 Monate), die noch nicht die 6-Jahres-Tdap-Dosis erhalten haben, erhalten eine Dosis des poliofreien Tdap-Impfstoffs (Boostrix®). **4. TETANOS-DIPHTHERIE-TOSPHERIN (Tdpa; Boostrix®):** eine Dosis im Alter von 14 Jahren (geboren im Jahr 2011) an diejenigen, die ab dem Alter von 10 Jahren kein Tdpa erhalten haben. Impfnachholung mit einer Dosis für 15- bis 18-Jährige, die ab dem Alter von 10 Jahren kein Td oder Tdpa erhalten haben. Diese Maßnahme gilt ab dem 1. März 2025. **5. TETANOS-DIPHTHERIE (Td; Diftavax®):** Überprüfen des früheren Impfstatus, bevor eine Td-Erstimpfung bei Erwachsenen eingeleitet oder abgeschlossen wird. Erforderlichenfalls ist mit Td zu impfen, bis 5 Dosen erreicht sind. Eine Dosis im Alter von 65 Jahren wird für Personen empfohlen, die im Kindes- und Jugendalter 5 Dosen erhalten haben. **6. HEPATITIS B:** Bei Neugeborenen, deren Mutter an Hepatitis B erkrankt ist (HBsAg+), wird die erste Dosis innerhalb der ersten 24 Stunden (vorzugsweise innerhalb der ersten 12 Stunden) zusammen mit Anti-HB-Immunglobulin verabreicht. Bei einer Mutter mit unbekanntem HBsAg-Wert erhält das Neugeborene, wenn die Ergebnisse nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt vorliegen, ebenfalls eine Dosis des Hepatitis-B-Impfstoffs. In allen Fällen wird das Standardprogramm der sechswertigen Impfung fortgesetzt: 2, 4 und 11 Monate. **7. HEPATITIS B:** Bei bisher ungeimpften Personen bis zu 18 Jahren mit einem 3-Dosen-Schema (0, 1 und 6 Monate). **8. ROTAVIRUS (vorbehaltlich der Zuteilung der kommerziellen Zubereitung):** Beginnt in der zweiten Hälfte des Jahres 2025. Der Termin für den Beginn der ersten Impfung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Leitfaden abhängig vom letztendlich ausgewählten Präparat. **9. 20-VALENTE PNEUMOKOKKEN-KONJUGATIMPSTOFF (VNC20; Prevenar 20®):** Eine Dosis für alle Personen, die zwischen dem 1. Januar 1949 und dem 31. Dezember 1965 geboren wurden und zuvor weder PCV13, PCV15 noch PCV20 erhalten haben. Die neu aufgenommenen Jahrgänge (1949, 1950, 1965) werden ab dem 1. März 2025 ihre Verabreichung aufnehmen. **10. MENINGOKOKKEN B (MenB; Bexsero®):** Für Neugeborene, die am oder nach dem 1. Oktober 2021 geboren wurden. **11. MENINGOKOKKEN ACWY (MenACWY; Nimenrix®):** Eine Dosis nach 4 Monaten. **12. MENINGOKOKKEN ACWY (MenACWY; MenQuadfi®):** eine Dosis nach 12 Monaten. **13. MENINGOKOKKEN ACWY (MenACWY; MenQuadfi®):** Eine Dosis für Jugendliche im Alter von 12 Jahren (geboren 2013) und Nachholimpfung im Alter von 13-18 Jahren, die nicht mindestens eine Dosis Meningokokken ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® oder Menveo®) im Alter von 10 Jahren erhalten haben. **14. DREIFACH-VIRUSIMPfung (Masern, Röteln und Mumps) (TV; M-R-V-VaxPro®):** Die Nachholimpfung wird für Personen unter 65 Jahren (vorzugsweise nach 1978 Geborene) empfohlen, die weder geimpft sind noch jemals an Masern erkrankt waren. Zwei-Dosis-Schema mit einem Mindestabstand von 4 Wochen. Es ist kontraindiziert bei schwangeren Frauen und immungeschwächten Personen. **15. WINDPOCKEN (VVZ; Varivax®):** Die Nachholimpfung wird für Personen unter 65 Jahren empfohlen, die noch nie geimpft wurden und noch nie Windpocken hatten. Programmierte Nachholimpfung im Alter von 12 Jahren. 2-Dosen-Schema mit einem Mindestabstand von 4 Wochen (vorzugsweise 8 Wochen). Bei Erwachsenen sollte eine Windpockenserologie (IgG) durchgeführt werden, wenn keine Erkrankung oder Impfung in der Vorgeschichte vorliegt. Es ist kontraindiziert bei schwangeren Frauen und immungeschwächten Personen. **16. HUMANES PAPILLOMAVIRUS (HPV; Gardasil 9®):** Ein-Dosis-Schema für Mädchen und Jungen im Alter von 12 Jahren (geboren im Jahr 2013) und Ein-Dosis-Nachholimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 13-18 Jahren, die noch keine Dosis eines HPV-Impfstoffs (Cervarix®, Gardasil® oder Gardasil 9®) erhalten haben. **17. INFLUENZA:** Eine Dosis wird in jedem Trimester der Schwangerschaft oder während der ersten 6 Monate des Wochenbetts, während der jährlichen Grippekampagne empfohlen. **18. Jährliche GRIPPE:** Eine Dosis wird für alle Kinder im Alter von 6-59 Monaten während der jährlichen Grippekampagne empfohlen. **19. Jährliche Grippe:** Eine Dosis wird für alle Menschen ab 60 Jahren während der jährlichen Grippekampagne empfohlen. **20. COVID-19:** Eine Dosis wird in jedem Trimester der Schwangerschaft oder während der ersten 6 Monate der postpartalen Periode empfohlen. **21. COVID-19 jährlich:** Eine Dosis wird für alle Personen ab 60 Jahren empfohlen. **22. HERPES ZOSTER (HZ; Shingrix®):** Ein 2-Dosen-Schema im Abstand von mindestens 2 Monaten für alle Personen im Alter von 65 Jahren (geboren 1960) wird empfohlen. Nachholimpfung für ungeimpfte Personen des Jahrgangs 1959. Der Jahrgang 1960 wird am 1. März 2025 beginnen.

**VRS:** Monoklonaler Antikörper gegen Respiratorisches Synzytialvirus.  
**Tdpa:** Impfung gegen Tetanus, Diphtherie und azelluläre Pertussis, gering dosiert oder für Erwachsene.  
**DTPa:** Impfung gegen Tetanus, Diphtherie und azelluläre Keuchhusten, hochdosiert oder für Säuglinge.  
**Td:** Impfung gegen Tetanus und Diphtherie für Erwachsene.  
**VPI:** Impfung gegen Inaktivierter Poliovirus mit Totimpfstoff.  
**HB:** Impfung gegen Hepatitis B.  
**Hib:** Impfung gegen Haemophilus influenzae Typ b.  
**RV:** Impfung gegen Rotavirus.  
**VNC20:** Impfung gegen Pneumokokken mit 20-valentem Konjugatimpfstoff.  
**MenB:** Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe B.  
**MenACWY:** Impfung gegen Meningokokken mit Konjugatimpfstoff der Serogruppen A, C, W und Y.  
**TV:** Dreifach-Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln.  
**VVZ:** Impfung gegen Varizella-Zoster-Virus.  
**VPH:** Impfung gegen das humane Papillomavirus.  
**HZ:** Impfung gegen Herpes Zoster.