


CALENDARIO SISTEMATICO VACCINALE E DELLE IMMUNIZZAZIONI

2025

ANDALUSIA, SPAGNA

Data di aggiornamento: Febbraio 2025



1. ANTICORPO MONOCLONALE ANTI-VRS (virus respiratorio sinciziale) (nirsevimab, Beyfortus®): durante la stagione VRS (da ottobre a marzo), si raccomanda una dose alla nascita o nei primi mesi di vita; soggetti nati dal 1° aprile al 30 settembre (prima della stagione VRS): somministrazione di nirsevimab dall'ultima settimana di settembre; soggetti nati dal 1° ottobre al 31 marzo (durante la stagione VRS): somministrazione di nirsevimab quanto prima alla nascita. **2. TETANO-DIFTERITE-PERTOSSE (Tdpa; Boostrix®):** una dose per ogni gravidanza a partire dalla 27ª settimana di gestazione, ma preferibilmente alla 27ª o 28ª settimana. **3. TETANO-DIFTERITE-PERTOSSE-POLIOMIELITE (DTPa-IPV; Tetraxim®):** una dose all'età di 6 anni (soggetti nati nel 2019). Recupero per i soggetti nati dal 1° gennaio 2017 in poi che hanno ricevuto un ciclo 2+1 (2, 4 e 11 mesi). I soggetti nati prima del 2017 (hanno ricevuto un ciclo 3+1: 2, 4, 6 e 18 mesi) a cui non è ancora stata somministrata la dose dei 6 anni sarà somministrata una dose di vaccino Tdpa senza pollo (Boostrix®). **4. TETANO-DIFTERITE-PERTOSSE (Tdpa; Boostrix®):** una dose all'età di 14 anni (nati nel 2011) ai soggetti a cui non è stato somministrato Tdpa a partire dai 10 anni di età. Recupero con una dose ai soggetti di 15-18 anni che non hanno ricevuto Td o Tdpa dall'età di 10 anni. Questa vaccinazione inizierà a partire dal 1° marzo 2025. **5. TETANO-DIFTERITE (Td; Diftavax®):** controllare lo stato vaccinale prima di iniziare o completare il ciclo della vaccinazione primaria con Td in soggetti adulti. Se necessario, sarà somministrato il vaccino con Td fino a completare le 5 dosi. Si raccomanda una dose all'età di 65 anni ai soggetti che hanno ricevuto 5 dosi nell'infanzia e l'adolescenza. **6. EPATITE B:** ai neonati le cui madri sono affette da epatite B (AgHBs+) la prima dose sarà somministrata nelle prime 24 ore di vita (preferibilmente nelle prime 12 ore), unitamente all'immunoglobulina anti-epatite B. Nel caso in cui non sia noto lo stato AgHBs della madre e non sia possibile disporre dei risultati nelle prime 24 ore di vita, al neonato sarà somministrata anche una dose di vaccino anti-epatite B. In tutti questi casi, si proseguirà con il ciclo standard di vaccinazione esavalente: 2, 4 e 11 mesi. **7. EPATITE B:** in soggetti non vaccinati in precedenza, fino ai 18 anni di età con un ciclo di 3 dosi (0, 1 e 6 mesi). **8. ROTAVIRUS (in attesa dell'assegnazione del preparato commerciale):** la vaccinazione comincerà nel secondo semestre del 2025. La data di inizio della vaccinazione primaria sarà comunicata successivamente. Ciclo di vaccinazione in attesa del preparato prescelto in ultima istanza. **9. PNEUMOCOCCO 20-VALENTE CONIUGATO (VNC20; Prevenar 20®):** una dose a tutti i soggetti nati tra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1965 senza anamnesi di vaccinazione pregressa né di VNC13, né di VNC20. La somministrazione alle nuove coorti incluse (1949, 1950, 1965) comincerà il 1° marzo 2025. **10. MENINGOCOCCO B (MenB; Bexsero®):** soggetti nati dal 1° ottobre 2021 in poi. **11. MENINGOCOCCO ACWY (MenACWY; Nimenrix®):** una dose all'età di 4 mesi. **12. MENINGOCOCCO ACWY (MenACWY; MenQuadfi®):** una dose all'età di 12 mesi. **13. MENINGOCOCCO ACWY (MenACWY; MenQuadfi®):** una dose agli adolescenti di 12 anni di età (nati nel 2013) e recupero dai 13 ai 18 anni di età ai soggetti che non hanno ricevuto almeno una dose di meningococco ACWY (Nimenrix®, MenQuadfi® o Menveo®) dai 10 anni di età. **14. TRIVALENTE (morbillo, rosolia e parotite) (MPR; M-R-V-VaxPro®):** è raccomandata la vaccinazione di recupero ai soggetti di età inferiore ai 65 anni (preferibilmente quelli nati dal 1978 in poi) senza anamnesi di vaccinazione pregressa o di infezione pregressa da morbillo. Ciclo di 2 dosi con un intervallo minimo di 4 settimane. È controindicato nelle donne in gravidanza e nei soggetti immunodepressi. **15. VARICELLA (VVZ; Varivax®):** la vaccinazione di recupero è raccomandata nei soggetti di età inferiore ai 65 anni senza anamnesi di vaccinazione pregressa o di infezione pregressa da varicella. Strategia programmata di recupero ai 12 anni. Ciclo di 2 dosi con un intervallo minimo di 4 settimane (preferibilmente 8 settimane). Nei soggetti adulti, verrà eseguita sierologia della varicella (IgG) in caso di assenza di vaccinazione o di infezione pregressa. È controindicato nelle donne in gravidanza e nei soggetti immunodepressi. **16. PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV; GARDASIL 9®):** ciclo di una dose a ragazze e ragazzi di 12 anni di età (nate/ nel 2013) e una dose di recupero a ragazze e ragazzi di età compresa tra 13 e 18 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino contro l'HPV (Cervarix®, Gardasil® o Gardasil 9®). **17. INFLUENZA:** si raccomanda una dose in qualsiasi trimestre di gravidanza o durante i primi 6 mesi di post-partum, nel corso della campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale. **18. INFLUENZA annuale:** si raccomanda una dose a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 6 e i 59 mesi durante la campagna antinfluenzale annuale. **19. INFLUENZA annuale:** si raccomanda una dose a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni durante la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale. **20. COVID-19:** si raccomanda una dose in qualsiasi trimestre di gravidanza o nei primi 6 mesi del periodo postpartum. **21. COVID-19 annuale:** si raccomanda una dose a tutti i soggetti di età pari o superiore a 60 anni durante la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale. **22. HERPES ZOSTER (HZ; Shingrix®):** si raccomanda un ciclo di 2 dosi, con un intervallo minimo di 2 mesi, a tutti i soggetti di 65 anni di età (nati nel 1960). Recupero per i soggetti nati nel 1959 non vaccinati. La coorte del 1960 inizierà il 1° marzo 2025.

VRS: Anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale.
Tdpa: Vaccino anti-tetano/difterite/pertosse acellulare per adolescenti e adulti, con dosi più basse di componenti della difterite e pertosse.
DTPa: Vaccino anti-tetano/difterite/pertosse acellulare per uso pediatrico.
Td: Vaccino antitetanico e antidifterico per adulti.
IPV: Vaccino anti-polio inattivato.
HB: Vaccino anti-epatite B.
Hib: Vaccino anti-Haemophilus influenzae tipo B.
RV: Vaccino anti-Rotavirus.
VNC20: Vaccino pneumococcico coniugato 20-valente.
MenB: Vaccino anti-meningococco di sierogruppo B.
MenACWY: Vaccino anti-meningococco coniugato dei sierogruppi A, C, W e Y.
MPR: Vaccino anti-morbillo-parotite-rosolia.
VVZ: Vaccino anti-varicella zoster.
HPV: Vaccino anti-papillomavirus umano.
HZ: Vaccino anti-herpes zoster.